



Masern-Mumps-Röteln

IMPFINDIKATION PRÜFEN (GGF. WEITERE IMPFLÜCKEN ERFASSEN)

Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
Zweimalige Impfung zwischen 11. und 23. Lebensmonat



KONTRAINDIKATIONEN PRÜFEN

Wer an einer akuten, **behandlungsbedürftigen Krankheit mit Fieber leidet**, sollte nicht geimpft werden.

Auch sollten Personen mit einer **Immunmangelkrankheit** – angeboren, erworben, durch Medikamente bedingt – nicht geimpft werden.

Die MMR-Impfung soll nicht bei Personen vorgenommen werden, die innerhalb der letzten drei Monate Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten haben oder bei denen im gleichen Zeitraum eine Blutübertragung (Bluttransfusion) vorgenommen wurde. (Durch die hierbei übertragenen Schutzstoffe (Antikörper) gegen die genannten Viren kann die Wirkung ausbleiben.)

Wird eine MMR-Impfung bei Erwachsenen geplant, so ist zu beachten, **dass sie nicht bei Schwangeren vorgenommen werden soll.**

Ggf. Schwangerschaftstest

Aus dem gleichen Grund ist für die Dauer von mindestens drei Monaten nach der Impfung eine Schwangerschaft zu vermeiden.

KEINE KONTRAINDIKATION



IMPFAUFKLÄRUNG



IMPfung DURCHFÜHREN UND DOKUMENTIEREN

VORÜBERGEHENDE KONTRAINDIKATION



IMPFTERMIN VEREINBAREN