



Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

| IMPfung | ALTER IN WOCHE | ALTER IN MONATEN | | | | | ALTER IN JAHREN | | | | | | |
|--|----------------|------------------|----|-----------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|-------------------------|-------|
| | | 6 | 2 | 3 | 4 | 11-14 | 15-23 | 2-4 | 5-6 | 9-14 | 15-16 | 17 | AB 18 |
| Tetanus | | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | A2 | N | A (ggf. N) ^e | |
| Diphtherie | | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | A2 | N | A (ggf. N) ^e | |
| Pertussis | | | G1 | G2 | G3 | G4 | N | N | A1 | A2 | N | A (ggf. N) ^e | |
| Hib <i>H. influenzae</i> <i>Typ b</i> | | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | N | | | | | |
| Poliomyelitis | | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | N | A1 | N | ggf. N | | |
| Hepatitis B | | | G1 | G2 ^c | G3 | G4 | N | | N | | | | |
| Pneumokokken ^a | | | G1 | | G2 | G3 | N | | | | | S ^g | |
| Rotaviren | | G1 ^b | G2 | G3 | | | | | | | | | |
| Meningokokken C | | | | | | G1 (ab 12 Mo.) | | | N | | | | |
| Masern | | | | | | G1 | G2 | | N | | | S ^f | |
| Mumps, Röteln | | | | | | G1 | G2 | | N | | | | |
| Varizellen | | | | | | G1 | G2 | | N | | | | |
| Influenza | | | | | | | | | | | | S (jährl.) | |
| HPV <i>Humane Papillomviren</i> | | | | | | | | G1 ^d | G2 ^d | N ^d | | | |

NEU: Standardimpfung gegen Herpes zoster mit Totimpfstoff empfohlen für Personen ab 60 Jahren; weitere Informationen hier: (Epid. Bull. 50/2018)

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

N Nachholimpfung

(Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

a Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.

b Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.

c Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.

d Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 – 14 Jahren mit 2 Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).

e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Die nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.

f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit.

g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff.

Quelle: Robert Koch-Institut, Epidemiologisches Bulletin Nr. 34, 23. August 2018

