

# Patienteninformation

## Metamizol

Patienten-  
Info

In seltenen Fällen kann es durch die Einnahme von Metamizol (= Novamin = Novaminsulfon) zu einer lebensbedrohlichen Blutbildungsstörung kommen (Agranulozytose).

### Was sollten Sie wissen?

Metamizol ist ein Medikament, das bei starken Schmerzen hilft und meist gut verträglich ist. In sehr seltenen Fällen kann jedoch eine schwerwiegende Nebenwirkung auftreten. Dabei sinkt die Anzahl der weißen Blutkörperchen stark ab und schwächt damit das Immunsystem.

### Welche Beschwerden können, auftreten?

Achten Sie während der Behandlung oder kurz danach auf folgende Anzeichen:

- Fieber oder Schüttelfrost
- Halsschmerzen
- Schmerzen oder Veränderungen in den Schleimhäuten, zum Beispiel im Mund, Rachen, in der Nase oder im Genital- und Analbereich.

### Was sollten Sie tun?

- Brechen Sie die Einnahme von Metamizol ab und suchen Sie schnell ärztliche Hilfe.
- Informieren Sie Ihren Arzt/ihre Ärztin darüber, dass Sie Metamizol nehmen.

### Wer sollte Metamizol nicht einnehmen?

- Agranulozytose in der Vorgeschichte.
- Menschen mit Erkrankungen des Blutes oder des Knochenmarks.

Bitte achten Sie während der Behandlung gut auf Ihren Körper und suchen Sie bei den genannten Symptomen unsere Praxis auf.

Ihr Praxisteam